

Protocole Pluri-professionnel

Vaccination

Destinataires : Médecins, Infirmiers.

Objectifs :

1. Actualiser, annuellement, les connaissances des professionnels de santé concernant les nouveautés du calendrier vaccinal (parution du BEH fin avril et juin).
2. Améliorer la traçabilité des vaccinations individuelles quelque soit l'âge (perte de carnets de santé de l'enfant ou de vaccination de l'adulte assez fréquentes).
3. Sensibiliser tous les professionnels de santé aux relances des usagers concernant leur couverture vaccinale.
4. Poursuivre l'effort concernant vaccination rougeole, rubéole, oreillons (RRO) pour atteindre 95 % de vaccinés avant l'âge de 24 mois.
5. Prendre en compte de façon spécifique les situations à risque particulier (risques professionnels, voyageurs, grossesse, immunodéprimés et allergies).

Messages Clefs :

1. Vaccination systématique, 1 dose, contre le méningocoque C entre 12 et 24 mois. Rattrapage recommandé chez le jeune adulte.
2. Privilégier l'usage de vaccin hexavalent lors de la primo-vaccination du nourrisson.
3. Il est recommandé de pratiquer de rappel anticoquelucheux à 6 ans.
4. Penser à pratiquer un rappel unique de coqueluche acellulaire à dose réduite (ca) chez l'adulte, simultanément au rappel dTP, à au moins 2 ans d'intervalle du précédent dTP.
5. Dans le doute sur la date de la dernière vaccination dTP chez l'adulte ne pas hésiter à revacciner (pas de problème de tolérance). Rappel dTP recommandé à 45 ans, 65 ans puis tous les 10 ans (diphtérie dose réduite).
6. Vaccination contre l'encéphalite à tiques recommandée pour tout voyageur séjournant en zone d'endémie, rurale ou forestière, du centre Europe du printemps à l'automne. Trois inj M0, entre M1 et M3 puis entre M5 et M12, Présentation spécifique pédiatrique à partir de 1 an.
7. Grossesse : vaccinations à envisager en fonction du risque infectieux encouru, VAT, Polio et grippe possibles.
8. Aucune vaccination, réalisée par mégarde ne justifie d'interrompre la grossesse. En

- cas de doute et besoins d'information, consulter le CRAT,
9. Risques professionnels : secteurs concernés : santé, médico-social, social, administration pénitentiaire et les professionnels intervenants dans les écoles maternelles ;
 10. Vaccination papillomavirus des JF, intéressante dans la prévention des lésions du col, sans preuve actuelle sur la prévention du cancer du col. Laisser en option après dialogue médecin-jeune fille (-parents).
 11. Chez le nourrisson, il est possible de vacciner contre le rotavirus, principal virus responsable des GEA nécessitant une hospitalisation. Tout en informant les parents du risque d'IIA,

Moyens :

1. Deux réunions pluriprofessionnelles par an (Mai et Novembre) sont réalisées sur les actualités vaccinales.
2. Un bulletin BEH de l'année « Recommandations pour les voyageurs » et le dernier « Calendrier vaccinal » ainsi qu'un tableau synoptique du calendrier vaccinal est à disposition dans chaque cabinet et accessible sur Internet.
3. Tous les vaccins effectués en consultation, en séance de vaccination, à l'infirmierie sont notés dans le dossier médical informatisé. Si un rappel est nécessaire il est noté grâce à la fonction «alerte programmée» du logiciel.
4. Si le temps le permet, le professionnel de santé peut noter dans le logiciel l'ensemble des vaccins reçus par le patient même s'il n'en n'est pas l'auteur.
5. Durant les séances de vaccinations gratuites, mise à jour de la base données du logiciel municipal permettant de faire des relances courriers ciblées visant à inciter une mise à jour vaccinale pour les enfants scolarisés sur la ville.
6. Recueil dans le dossier médical des questions posés par les parents ainsi que leurs réticences sur les vaccins ainsi que les réponses apportées par le professionnel de santé.
7. Mise à disposition dans la salle d'attente de documents spécifiques sur les différents vaccins, calendrier vaccinaux (Inpes).

Evaluation :

Élaborations de requêtes permettant de connaître le taux de vaccination d'une classe d'âge ayant reçu un vaccin donné (par exemple vaccin contre le méningocoque chez les < 20 ans).